

Materiál k vyplňování a ošetření kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: MTA+ powder: oxid vápenatý a oxidy: křemíku, železa, hliníku, sodíku, draslíku, bizmutu, hořčíku, zirkonu, fosforečnan vápenatý.

URČENÍ

Výrodek je určený pro stomatologické ošetření jako výplňový a remineralizační materiál kořenových kanálků. Po smíchání s vodou začíná tuhnout za 6–10 minut.

Díky velkému obsahu vápenných iontů působí remineralizačně na zubní tkáň. Vápeno-křemíkové sloučeniny podporují regeneraci tkání po perforaci stěn a resorpci v kanálcích.

MTA+ doporučujeme zejména v případech:

- perforace stěn kořenových kanálků,
- resorpcie v kanálcích,
- vyplnění zadního vrcholu kořene,
- přímého překrytí pulpy,
- pulpotomie,
- léčby zubů s nevyvinutými kořeny.

MTA+ nepoužívejte jako samostatnou permanentní výplň kanálků.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Odřízněte špičku pipety označené nápisem MTA+ liquid. Celý obsah skleněné lahvičky s nápisem MTA+ powder a 1–2 kapky tekutiny MTA+ liquid přeneste na míchací destičku.

Míchejte po dobu 30 sekund, dokud nedosáhnete konzistence mokrého písku. Jestliže je materiál příliš hustý nebo sypký, musíte přidat další kapku tekutiny (nebo destilované vody). Přípravek aplikujte na požadovaném místě pomocí cpátka.

Kontakt s vlhkem nebo krví urychluje tuhnutí přípravku.

Balení MTA+ powder obsahuje dávku pro jednorázové použití.

Po smíchání s tekutinou MTA+ liquid (nebo destilovanou vodou) musíte připravenou dávku spotřebovat nejpozději do 10 minut. Po uplynutí této doby dochází k vytvrnutí připravené hmoty. Po otevření spotřebujte balení MTA+ liquid do 12 měsíců.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

Nepoužívejte přípravek u zánětlivých stavů, protože kyselé pH narušuje tuhnutí MTA+.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Přípravek může poškodit oči.

Působí dráždivě na sliznice ústní dutiny, kůže a očí. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem použijte koferdam, jednorázové rukavice a ochranné brýle.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před vlhkem.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Skleněná lahvička s obsahem 0,14 g prášku MTA+ powder, pipeta s obsahem 1 ml tekutiny MTA+ liquid.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85