

RUBBER-DAM liquid



Světlem vytvrzovaný tekutý kofferdam

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: uretanové pryskyřice, anorganická plniva

URČENÍ

Světlem vytvrzovaný tekutý kofferdam je určený k:

- ochraně dásní během stomatologických zákroků: bělení, leptání, mikroabraze, pískování atd.
- utěsnění gumového kofferdamu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ochrana dásní během stomatologických zákroků:

Vyčistěte a osušte dásně. Pomocí odpovídajících nástrojů (např. rozvěrače) zafixujte rty a jazyk, aby nedošlo ke kontaktu s přípravkem. Sejměte uzávěr stříkačky a nasadte na ni přiložený jednorázový aplikátor. Aplikujte RUBBER-DAM LIQUID podél oblasti použití v šířce 4–6 mm a tloušťce 1,5–2 mm, zároveň pohledem kontrolujte množství nanášeného přípravku. Pokud je to možné, protlačte RUBBER-DAM LIQUID přes mezizubní prostory. Přípravek vytvrzujte 15 vteřin pomocí polymerační lampy. Proces vytvrzování provádějte rovnoměrným přejížděním nad místem aplikace. Následně přejděte ke stomatologickému zákroku. Po zákroku zasuňte nástroj na jednom konci pod vytvrzený RUBBER-DAM LIQUID a odstraňte ho.

Utěsnění gumového kofferdamu:

Překryjte pracovní oblast (zub/zuby/zubní lůžko) gumovým kofferdamem RUBBER-DAM.

Utěsnění gumového kofferdamu: naneste vrstvu RUBBER-DAM LIQUID na hranici dásní a gumového kofferdamu. Přípravek vytvrzujte 15 vteřin pomocí polymerační lampy. Proces vytvrzování provádějte rovnoměrným přejížděním nad místem aplikace. Následně přejděte ke stomatologickému zákroku. Po zákroku zasuňte nástroj na jednom konci pod vytvrzený RUBBER-DAM LIQUID a odstraňte ho.

Okamžitě po použití stáhněte píst stříkačky a uzavřete originální obal šroubovacím uzávěrem, aby nedocházelo k polymeraci přípravku ve stříkačce.

Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití.

Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte přípravek u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Nevytvrzený přípravek dráždí kůži a oči. Při delším kontaktu s kůží může vyvolávat přecitlivělost. V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte vodou. Po požití může působit škodlivě.

V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte proti slunečnímu záření. Po použití těsně uzavřete. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Stříkačka s obsahem 1,2 ml přípravku, jednorázové aplikátory.



Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1



PH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85